

Medikamente die am OP-Tag verabreicht werden	Folgende Medikamente werden am OP-Tag pausiert
Betablocker	
Ca-Antagonisten	
Nitrate und Molsidomin	
Digitalis Indikation normofrequente absolute Arrhythmie	Digitalis Indikation: Herzinsuffizienz
Antiarrhythmika	
Alphaagonisten	
Alpha-Blocker	
ACE Hemmer, AT-II Antagonisten Weiterführen bei Therapie der Herzinsuffizienz mit linksventrikulärer Dysfunktion	ACE Hemmer, AT-II Antagonisten Absetzen bei großen Eingriffen /Sympathikolyse/ Volumenverschiebung Pausieren am OP-Tag, wenn zur antihypertensiven Therapie eingesetzt Cave alte Patienten/ neu verabreicht + Betablocker Zusätzlich am Abend vor OP pausieren, sobald möglich postop. einnehmen
Statine	
Theophyllinpräparate	
Pulmonale obstruktive Medikation	
Beta 2-Mimetika	
Antiepileptika	
Parkinsonmedikation	
Schilddrüsenhormone	
Neuroleptika	
Trizyklische Antidepressiva	
SSRI, SNRI	
Reversible MAO Hemmer	Irreversible MAO Hemmer 14d vor Eingriff vom Psychiater auf reversible MAO Hemmer umstellen lassen
Lithium bei kurzen Eingriffen	Lithium bei längeren Eingriffen 3d vorher absetzen (ggf. Lithiumspiegel)
Ritalin	
Insulingabe immer in Rücksprache mit dem Anästhesisten	Insulingabe immer in Rücksprache mit dem Anästhesisten
Orale Antidiabetika weitergeben	Orale Antidiabetika vom Biguanidtyp (Metformin) 24 Std vor Eingriff absetzen (Glucophage®)
Steroide Dauertherapie fortsetzen	